



Betegtájékoztató

Szülészeti fájdalomcsillapításról (Peridurális érzéstelenítés)

Tisztelt Betegünk!

Ezen rövid tájékoztatót az Ön érdekében készítettük. Kérjük, tekintse át gondosan, s amennyiben ezután is maradnak megválaszolatlan kérdései, forduljon bizalommal orvosához.

A szülési fájdalom az egyetlen természetes fájdalom. Ennek csillapítására irányuló törekvések az orvoslás őskorába nyúlnak vissza. Nehéz olyan módszert találni, amely enyhíti, vagy teljesen megszünteti a vajúdas fájdalmait, de ugyanakkor a magzatra nem károsak a használt gyógyszerek. Napjainkban egyik legeredményesebben alkalmazott módszer a gerincközei, szakmai nyelven lumbális epidurális (peridurális) érzéstelenítés.

A gerincközei (LPDA) érzéstelenítés alkalmával a csontos gerinccsatorna és a gerincvelő külső burka közé egy erre alkalmas tüvel speciális kanült vezetünk fel, helyi érzéstelenítés után.

A kanülon keresztül adagoljuk a fájdalomcsillapítást előidéző gyógyszert. Ezzel az eljárással elérhető, hogy a méh összehúzó tevékenysége (fájások) megmaradnak, de az ezzel járó fájdalom érzés a szülés alatt megszűnik. Ezen fájdalomcsillapító eljárással műtéteket lehet elvégezni úgy, hogy a magzatot gyógyszerkárosodás nem éri, valamint elkerülhető a gépi altatás fokozott veszélye. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy az ily módon alkalmazott fájdalomcsillapítás mellett született újszülöttek jobb állapotban jöttek a világra, mint fájdalomcsillapítás nélkül.

A fájdalomcsillapítás a szülésnek csak egy bizonyos időszakában alkalmazható csak, megfelelő fájástevékenység (5-6 percenként jelentkező, normális erősségű fájások) és minimum kétujjnyi, maximum háromujjnyi tágasságú méhszáj esetén. A túl korai, illetve túl késői alkalmazás a szülés menetét károsan befolyásolhatja.

Mint minden orvosi beavatkozásnak, így ezen fájdalomcsillapítási eljárásnak is lehetnek szövődményei:

- csökkenhet a méhizomzat összehúzóereje és így a szülés ideje megnyúlhat,
- előfordulhat a kanülálás során a gerincvelő burkának, vagy valamelyik idegnek a sérülése, amelyek átmeneti kellemetlenséget okozhatnak, nagyon súlyos esetben bénuláshoz vezethetnek

Aláírással igazolom, hogy a szülészeti fájdalomcsillapítással kapcsolatos felvilágosítást megkaptam, ennek elvégzését ezt követően:

A páciens neve:.....

Páciens aláírása:

kérem:.....

nem kérem:.....

Pécs, 20.....év.....hó.....nap Felvilágosító orvos:.....